
Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem wirusem ptasiej grypy

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie z dnia 15 maja 2023r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem potwierdzonego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich, informujemy iż na terenie Gminy Piecki zostało potwierdzone występowanie ptasiej grypy (*avian influenza*), rozporządzenie oraz zawiadomienie w załączniku.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje o chorobie oraz o sposobach zapobiegania jej rozprzestrzeniania.

O grypie ptaków:

Grypa ptaków (AI - Avian influenza), d. pomór drobiu (FP - Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako **niezwykle zakaźna choroba wirusowa drobiu**, która może powodować śmiertelność do 100%.

Chorobe wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. (czynniki etiologiczne: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus).

Zakażone ptaki wydają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

- kałem
- wydzieliną z oczu
- wydzieliną z dróg oddechowych
- wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

- kury i indyki - duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;
- kaczki i gęsi - wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. **Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;**
- perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy - wrażliwość podobna jak u kur i indyków;
- strusie - u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
- ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające - wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zagrożenie dla ludzi

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/**H5N8** u człowieka i w chwili obecnej **nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi**. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od **H5N1** oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest **pewna ostrożność**, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

GRYPA PTAKÓW – CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?

Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza we współpracy z Głównym Inspektorem Weterynarii i Państwowym Instytutem w Puławach **dokonała modyfikacji** opracowanej w 2017 roku **ulotki** dotyczącej **ZASAD BIOASEKURACJI** którą przedstawiamy poniżej:



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOSEKURACJI?



Zabezpiecz drogi i paszę przed kontaktem z drobiem ptakami!



Nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione!




Pamiętaj o **mutach dezynfekcyjnych** i regularnie je stosuj jako aktywnym środkiem odkażającym.



Wprowadź **zakaz wstępu** na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurczaków, czy myśliwym).



Pamiętaj, żeby zawsze **zakładać odzież i obuwie ochronne** przed wejściem do kurczaka i zwierząt, je każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.



Wyszczepaj na fermę wyłącznie pojazdy z **odkazywanymi** kołami.



Zadbaj o **zabezpieczenie drożnicy**.



Pamiętaj o **dezynfekcji drożnicy** przed wniknięciem do kurczaka.



Zadbaj o **czystość każdego z kurczaków**, a także osobne żywienie i narzędzia.



Przebiegaj **regulacje** takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - **trzymaj je w zamknięciu**.



Zwiększona **śmiertelność** wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadki masy ciała oraz objawy **neurologiczne** (porażenie, drętwoty, dręgoty, biegunka, drżawość) **Nie zwlekaj - natychmiast powołaj lekarza weterynarii!**

Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo pod adresem:

- <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow>
- <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobieu-przed-grypa-ptakow>
- <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow-hpai-jest-grozna-dla-gospodarstw-utrzymujacych-drobie>